

O único DOAC que combina superioridade em segurança* e posologia 1x ao dia.¹⁻⁵



Pedro, 75 anos, aposentado

- Fibrilação atrial recém diagnosticada
- Diabetes
- CrCL 45mL/min

Considerando esse perfil de **paciente com fibrilação atrial não valvar**, você sabia que para a prevenção do AVC existe um **DOAC superior** à varfarina na redução de sangramento maior em **pacientes diabéticos**⁶ e redução de mortalidade em **pacientes renais**?⁷

FÁRMACO	PACIENTES	EVENTOS	DOACS EVENTOS POR 100 PT-ANO	VARFARINA EVENTOS POR 100 PT-ANO	PESOS	HR (IC 95%)
APIXABANA 5 MG	4547	226	3,01	3,12	18,6	0,96 (0,74-1,25)
DABIGATRANA 150 MG	2812	243	4,66	4,19	20,0	1,12 (0,87-1,44)
LIXIANA®	5066	405	3,2	4,07	33,4	0,79 (0,65-0,96)
RIVAROXBANA	5080	334	3,79	3,9	28,0	1,00 (0,81-1,24)
Efeitos aleatórios para História de Diabetes (Valor de P = 0,53) Q estatística = 5,26 p=15 1°=43,83%						0,95 (0,95-1,20)

Favorece DOACS

Favorece varfarina


Adaptado de Plitt et al. 2021

Lixiana® 30mg combina eficácia e segurança no paciente com fibrilação atrial não valvar e insuficiência renal (CrCl 30-50 mL/min), demonstrando redução de sangramento maior e morte por todas as causas em comparação à varfarina.⁷

Edoxabana 30mg 1x/dia no paciente com CrCl < 30-50 mL/min

Características	Pacientes	Idade mediana	CHA ₂ DS ₂ -VASc médio	HAS-BLED médio	TTR mediano (%)	Hipertensão	IC	≥75 anos (%)	Diabetes
CrCl > 50mL/min	11.331	70	4,2	2,4	68,7	92%	55%	31%	28%
Doença renal CrCl ≤ 50mL/min	2.740	79	5,0*	2,8	66,9	94%	59%	77%	38%

Bohula EA et. Al. Circulation. 2016 Jul 5;134(1):24-36



Adaptado de Bohula et. al. 2016